

## **2 Термические условия Дальневосточных морей**

### **Японское море**

Весь август в части моря южнее 42° с. ш. наблюдались области относительно тёплых вод с аномалиями температуры поверхности моря до +3,4 °С, +2,6 °С, +2,0 °С соответственно в первой, второй и третьей декадах месяца. Одновременно на севере акватории наблюдались относительно холодные воды, аномалии температуры поверхности моря здесь -0,5 °С, -1,6 °С, -3,6 °С в первой, второй и третьей декадах, соответственно (рис. 2-1).

### **Охотское море**

В первой и второй декадах августа в районе южных островов Курильской гряды наблюдались положительные аномалии температуры поверхности моря, достигающие +3,0 °С и +2,0 °С, соответственно. В районе залива Шелихова относительно теплые воды зарегистрированы во второй и третьей декадах, с величинами аномалий до +1,6 °С и 2,8 °С, соответственно. На основной акватории Охотского моря весь месяц наблюдались относительно холодные воды с аномалиями температуры поверхности моря до -2,0 °С (рис. 2-2).

### **Берингово море**

На всей акватории Берингова моря наблюдались относительно теплые поверхностные воды с максимальными величинами аномалий на востоке акватории до +3,4 °С, +4,4 °С и +4,8 °С соответственно по декадам (рис. 2-3).




Рис. 2-1 Средняя декадная температура воды (изолинии) и её аномалия (изополосы), Японское море, декады август: 1 – а, 2 – б, 3 – в




Рис. 2-2 Средняя декадная температура воды (изолинии) и её аномалия (изополосы), Охотское море, декады август: 1 – а, 2 – б, 3 – в




Рис. 2-3 Средняя декадная температура воды (изолинии) и её аномалия (изополосы), Берингово море, декады август: 1 – а, 2 – б, 3 – в