


4 Волнение на дальневосточных морях


Полную версию бюллетеня «Волна» (все районы дальневосточных морей, диаграммы повторяемости градаций высоты волн) можно смотреть на официальном сайте ФГБУ «ДВНИГМИ» <http://www.ferhri.org>, в разделе «Направления работ», далее – «Статистика повторяемости ветра и волнения по ДВ морям».

4.1 Северо-западная часть Японского моря, район 11440


(район, прилегающий к южному побережью Приморского края: к северу от 41° с. ш. и к западу от 135° в. д.)




В первой декаде января максимальные волны наблюдались в точке с координатами $41,0^{\circ}$ с. ш., $132,5^{\circ}$ в. д., имели высоту 4,8 м, перемещались с севера. Площадь, занятая льдом, составляла 2,2%.



Во второй декаде января максимальные волны наблюдались в точке с координатами $41,0^\circ$ с. ш., $131,0^\circ$ в. д., имели высоту 2,8 м, перемещались с севера. Площадь, занятая льдом, составляла 2,6%.




В третьей декаде января максимальные волны наблюдались в точке с координатами $42,0^\circ$ с. ш., $132,5^\circ$ в. д., имели высоту 5,0 м, перемещались с северо-востока. Площадь, занятая льдом, составляла 4,2%.




В январе в районе 11440 Японского моря максимальные волны наблюдались в точке с координатами $42,0^{\circ}$ с. ш., $132,5^{\circ}$ в. д., имели высоту 5,0 м, перемещались с северо-востока. В среднем за месяц лед занимал 3,0 % площади района.

4.2 Юго-восточная часть Охотского моря, подрайон 11432


(северо-восточная часть района 11430, подрайон 11432: от 48° с. ш. до 51° с. ш., к востоку от 150° в. д. до Курильской гряды)




В первой декаде января максимальные волны наблюдались в точке с координатами 50,5° с. ш., 150,0° в. д., имели высоту 8,2 м, перемещались с юго-востока. Площадь, занятая льдом, составляла 2,4%.



Во второй декаде января максимальные волны наблюдались в точке с координатами $50,5^{\circ}$ с. ш., $155,0^{\circ}$ в. д., имели высоту 2,9 м, перемещались с севера. Площадь, занятая льдом, составляла 2,3%.



В третьей декаде января максимальные волны наблюдались в точке с координатами $48,5^{\circ}$ с. ш., $153,5^{\circ}$ в. д., имели высоту 8,0 м, перемещались с востока. Площадь, занятая льдом, составляла 1,0%.



В январе в районе 11432 Охотского моря максимальные волны наблюдались в точке с координатами 50,5° с. ш., 150,0° в. д., имели высоту 8,2 м, перемещались с юго-востока. В среднем за месяц лед занимал 1,8 % площади района.